




DODAARS

Wetenschappelijke naam: *Tachybaptus ruficollis* (Pallas, 1764)

Vogelgroep: Futen



VELDKENMERKEN

25-29 cm. Kleinste fuut. Heeft stomp achterlichaam, korte nek en korte, relatief dikke snavel. In broedkleed bovendelen donkerbruin met kastanjebruine keel, wangen en voorzijde van nek. Snavelbasis en mondhoek helder geelgroen, opvallende lichte vlekken vormend op overigens donkere kop. Flanken grijsig bruin; onderdelen een mengsel van wit en zwartbruin. Bovendelen 's winters veel bleker, met witte kin en wangen, keel en voorzijde van nek gelig bruin. Juveniel met onregelmatige witte vlekken op kopzijden. In vlucht variabele hoeveelheid wit op vleugels, maar meestal weinig of geen.

GELUID

Een luide, hinnikende triller, ook een kort 'wit wit'.

VOORKOMEN

Algemene standvogel. Onopvallende, nachtelijke trek komt voor.

HABITAT

In broedtijd allerlei biotopen: alle soorten stilstaand of langzaam stromend zoetwater met voldoende dekking, in open landschap of in bossen. Ook in kanalen, langzaam stromende rivieren, delta's en beken. Buiten broedtijd op beschutter open binnenwateren, riviermondingen en langs de kust.

VOEDSEL

Insecten, schelpdieren, garnalen, amfibielarven, kleine vis. Vangt prooi voornamelijk door te duiken (tot 1 m), maar vangt ook insecten uit de lucht of van wateroppervlak.

